

CR de relevés de la FLORE et de la VÉGÉTATION

09 et 10 mars 2020 [2 a – m]

Rebuffel Georges Botaniste

Pour Thierry Reynier : Reynier environnement

Le terrain observé se situe au sud de l'agglomération de La Farlède, au nord d'une zone résidentielle (villas), au SE du centre commercial intermarché. Côté Est, il jouxte l'autoroute A57, dont il est séparé par une levée de terre. Il s'agit d'un terrain recouvert de végétation se rapportant à une **friche arbustive**, avec plusieurs bosquets, quelques rideaux d'arbres ponctuels, ainsi qu'un **verger de figuiers** (*Ficus carica*) « la figue de Solliès », entretenu, dans le tiers Est, près de l'autoroute.

Au moins trois espèces végétales rares et protégées

Anémone couronnée, ***Anemone coronaria*** ; **protection nationale (1982)**

Lotier pourpre, ***Lotus tetragonolobus*** [*Tetragonolobus purpureus*] ; **protection régionale (1994)**

Phalaris aquatique ou Alpiste, ***Phalaris aquatica*** ; **protection régionale (1994)**

pourraient être présentes, la base de données des CBN (Silene), indiquant des stations relativement récentes de ces espèces distantes à proximité de 400 m à 1500 m du site. (*Phalaris a.*, dern.obs. 2012 ; *Anemone C.* dern.obs.1992 (à 500m e), et 2011 (à 3 km w) ; *Lotus t.*, 2017(à 700 m SW)

Au 10 mars 2020, aucune de ces 3 espèces patrimoniales n'a été observée présente, cependant, les croissances et floraisons de végétaux n'étant que peu nombreuses à cette date précoce encore distante du printemps, leur présence sur le site pourrait être avérée en avril ou mai.

Les espèces les plus fréquentes observées dans la friche sont des plantes herbacées relativement ubiquistes, (fréquentes en plusieurs habitats), le plus souvent, **rudérales**, ou fréquentant les abandons agricoles (Spartier)

| Nom scientifique | Nom commun | famille | catégorie |
|--|----------------------------|------------------------------|-----------|
| <i>Foeniculum vulgare</i> | Fenouil sauvage | Ombellifères (Apiacées) | Pl. herb. |
| <i>Malva sylvestris</i> | Grande Mauve | Malvacées | Pl. herb. |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> | Euphorbe réveille-matin | Euphorbiacées | Pl. herb. |
| <i>Galactites elegans, G. tomentosa</i> | Galactite, Chardon laiteux | Composées (Asteracées) | Pl. herb. |
| <i>Piptatherum miliaceum</i> | Faux millet | Graminées (Poacées) | Pl. herb. |
| <i>Smyrniolum olusatrum</i> | Maceron | Ombellifères (Apiacées) | Pl. herb. |
| <i>Sixalis atropurpurea, Scabiosa maritima</i> | Scabieuse maritime | Dipsacacées (Caprifoliacées) | Pl. herb. |
| <i>Spartium junceum</i> | Spartier, genêt jonc | Papilionacées (Fabacées) | arbuste |
| | | | |

Plusieurs espèces des prés et lisières sont présentes et fleuries :

| Nom scientifique | Nom commun | famille | catégorie |
|---|----------------------------|--------------------------|-----------|
| <i>Vicia sativa</i> | Vesce cultivée (spontanée) | Papilionacées (Fabacées) | Pl. herb. |
| <i>Borrago officinalis</i> | Bourrache | Borraginacées | Pl. herb. |
| <i>Cepis sancta (Pterotheca nemausensis)</i> | Ptérothèque de Nîmes | Composées (Asteracées) | Pl. herb. |
| <i>Barlia robertiana (Himantoglossum longibracteatum)</i> | Barlie de Robert | Orchidacées | Pl. herb. |
| | | | |

Des canniers de Canne de Provence (*Arundo donax*) sont nombreux sur le site, espèce classique dans la plaine méditerranéenne ; ils forment un rideau boisé quasi continu en bordure Est, le long du talus contre l'autoroute, ainsi qu'au centre nord, et quelques touffes sur le terrain.

...**Quelques ronciers** de ronce à feuille d'orme (*Rubus ulmifolius*) au centre nord et nord est.

Un remarquable bosquet d'oliviers (*Olea europaea*) s'étendant sur ± 25 m x 15 m, sur le côté ouest du verger de figuiers, en contre haut d'environ 0m60 (une restanque existait vraisemblablement, quoiqu'il apparaisse que de la terre rapportée ainsi que des gravats (blocs de béton, ...) aient été déposés anciennement notamment au centre, au nord et au sud ouest...)

Un bosquet arboré de troène à feuilles ovales (*Ligustrum ovalifolium*), lauriers nobles (*Laurus nobilis*), et un platane (*Platanus acerifolius*), est présent à l'angle ouest, près de la route d'accès (rue de la Fontaine des Fabre)

Le terrain présente aussi 10 touffes (dont 3 « double ») de l'**espèce envahissante** offensive « Herbe de la Pampa » (*Cortaderia selloana*), qu'il conviendrait d'éradiquer (préconisation des services de l'Environnement, dont les CBN) par arrachage (tractopelle). L'espèce peut être vénéral, et rapidement coloniser l'ensemble d'un terrain ouvert (pré, champ abandonné)

Sur le site, elle est présente sur les bordures est (côté nord, au nord du verger), Nord-est et centre nord, autour du grand pré – friche, et une touffe -double isolée au centre (lisière nw des oliviers)

Un inventaire actualisé de la flore sera effectué en avril, et un, en mai, afin de relever les espèces vernalles et plus tardives, non encore visibles (non poussées), ou non identifiables actuellement car juste sorties de terre. (jeunes feuilles ou jeunes tiges feuillées).

[9 et 10 mars 2020 : 10 pages de relevés 17x22 cm ;

60 vues flore et végétation ;

6 vues bâtisse délabrée ; 1 vue cabanon agricole ; 1 vue bassin ; 1 vue pylône et compteur électrique]